



Conférence de Maurice CASTELEYN des serres Jacky Orchid. « Les petits trucs à savoir pour mieux cultiver nos orchidées »

Phalaenopsis

Orchidée qui se plaît à 18°C et plus.

L'arrosage se fait pour une fois par semaine par bassinage pendant 5 minutes. Ne jamais laisser d'eau dans la soucoupe.

Les boutons se forment à partir des nœuds tous les 10cm, quand la hampe florale est fanée, si vous coupez faites-le 1 cm au –dessus du nœud.

Sensible aux cochenilles vous pouvez les traiter avec du pétrole bleu, de l'eau de Cologne ou de l'alcool à 50%.

Lors d'un repotage, si votre *Phalaenopsis* a beaucoup de feuilles, en garder 5/6. Enlever les feuilles d'en bas de la plante. Vous pouvez repoter tous les 3 ans.

Brassia

Cultiver à tempéré mais respecter une température plus froide la nuit.

Oncidium

Comme le *Brassia*, sauf pour les *Oncidium* à feuilles dures et un peu plus rondes, la température de culture peut-être un peu plus élevée.

Cattleya

La floraison peut durer de 3 à 4 semaines.

Bon arrosage tous les 10 jours. Quand la spathe se forme cesser l'arrosage jusqu'à ce que l'on voit le bouton à l'intérieur. Si la spathe devient jaune, on peut aider en ouvrant le sachet.

Attention à bien respecter cette phase de repos nécessaire à la maturation du bouton.

Respecter également l'écart d'environ 5°C entre les températures de jour et de nuit.

Les *Cattleyas* à une feuille ont des fleurs d'une longueur d'environ 10 à 20 cm et sont parfumées.

Les *Cattleyas* à deux feuilles produisent des fleurs plus petites et ne sont pas parfumées.

Engrais 20/20/20. En hiver (de novembre à février) leur donner de l'engrais de tomate pour compenser la baisse de lumière.

Lycaste

Fleur d'environ 10 cm.

Du printemps à la fin de l'automne arrosez tous les 6/8 jours. Ne pas laisser le substrat totalement sécher entre deux arrosages.

Phase de repos de novembre à mars. Les poser sur le sol.

Si vous coupez les feuilles jaunies, attention aux épines acérées qui durcissent sur le bulbe.

Angraecum

Fleurissement pour la plupart des espèces entre juillet et février. Toutes les espèces ont un éperon aussi long. Fleurissement à la période de Noël pour *Angraecum sesquipedale* (synonyme « étoile de Bethléhem ». Les fleurs ont un éperon d'environ 35cm.

Engrais type Akerne.

Respecter une différence de température entre le jour et la nuit.

Vanda

La température jour peut s'élever à 30/35°C pour être baissée de 12°C la nuit.

Nécessité d'arroser le matin pour que la plante ait le temps de sécher avant la nuit.

Les *Vandas* peuvent être cultivées dans un compost : écorce, charbon de bois. Il faut faire tremper dans un seau, le *Vanda* pour que les racines s'assouplissent, puis repoter dans le contenant sans couvrir les premières feuilles.

En cas d'absence, poser plusieurs pipettes remplies d'eau sur plusieurs racines. L'été elles peuvent être au jardin, mais attention aux températures nocturnes qui seraient inférieures à 10°C.

Paphiopedilum Sabot de Vénus

Il n'y a pas de différence entre les *Paphiopedilum* à feuilles panachées et ceux à feuilles vertes point de vue de l'arrosage.

Bien vérifier l'origine des espèces botaniques afin de déterminer la température qui leur plaît ;

Orchidée à garder humide mais pas les racines dans l'eau.

Il peut être bon de les arroser de temps à autre avec de l'eau calcaire. La dose d'engrais est divisée par deux s'il est mis à chaque arrosage.

Pas de période de repos.

La floraison peut durer 2 mois.

A l'extérieur l'été, attention aux limaces.

Phragmipedium :

Contrairement au *Paphiopedilum* il faut lui mettre, en permanence, de l'eau dans la soucoupe.

Coelogyne

C'est une orchidée qui peut prendre beaucoup de volume et déborder de son pot. Un certain nombre dégage un parfum agréable ou non.

Une température de 14/15°C leur convient.

Astuce pour le repotage avec multiplication, vous prenez une pousse qui se dirige vers la gauche, une qui se dirige vers la droite, vous les assemblez ainsi de façon équilibrer.

Zygopetalum

Le bulbe sert de réserve pour le prochain qui se forme. La tige florale se développe sur la nouvelle pousse lorsqu'elle est mi-adulte. Elle poursuit sa croissance après la floraison.

Tempéré chaud. 18/20°C – 14/15°C.

Pas de période de repos. Attention à ne pas arroser avec de l'eau froide.

Dendrobium

Orchidée d'Asie

Bien arroser et donner de l'engrais entre fin mars et fin octobre (période de pluie dans la nature).

La nouvelle pousse doit être adulte avant mi novembre.

Après les tenir plus sec. Si les plantes laissent tomber une partie de leurs feuilles, pas de problème (dans la nature il se passe la même chose). Les boutons apparaissent après quelques semaines.

Légèrement vaporiser les plantes en hiver pour ce qu'elles ne sèchent pas trop.